

خودمراقبتی از کاتتر دو جداره موقت و دائم:

برای انجام دیالیز خونی شما و خروج سموم و مایعات اضافی از بدنتان نیاز به جریان خون مناسب برای دیالیز داریم بنابراین تا زمانیکه بتوان از فیستول شما استفاده نمود و یا زمانی که نیاز اورژانسی به دیالیز داشته باشید با روش جراحی در سیاهرگ مرکزی گردن یا سینه یا ران پای شما یک لوله پلاستیکی کار می‌گذارند تا از طریق آن بتوانید دیالیز شوید.

کاترها بلافاصله قابل استفاده می‌باشند.

کاترهای موقت (شالدون) با بخیه سر جای خود محکم می‌شوند و منظور از کاترهای دائمی کاترهایی هستند که مدت زمان طولانی تر مورد استفاده قرار می‌گیرند این کاترها را با یک روکش خاص و چند بخیه در زیر پوست محکم کار می‌گذارند.

از آنجاییکه قسمتی از کاتتر داخل بدن و قسمت دیگر از آن خارج بدن است احتمال آلوده شدن و عفونت در آن زیاد است.

لذا جهت پیشگیری از عوارضی مانند عفونت و خونریزی یا خارج شدن کاتتر نیاز به همکاری شما در موارد ذیل داریم:

- * کاتتر خود را همیشه تمیز و خشک نگه دارید.
- * جهت استحمام ابتدا روی پانسمان و لوله‌ها را با پلاستیک پوشانده سپس سر خود را به عقب گرفته و فقط موهای سر را بشویید مراقب باشید محل ورود لوله‌ها به پوست خیس نشود در صورت خیس شدن کاتتر و محل مربوطه سریعاً پانسمان خشک گذاشته شود.
- * کاتتر موقت بعد از هر جلسه دیالیز تعویض پانسمان می‌شود.
- * در صورت داشتن کاتتر دائم تعویض پانسمان باید تا مدت ۶ تا ۸ هفته انجام گیرد و پس از آن نیازی به وجود پانسمان نمی‌باشد.

- * در کاتتر داریم پس از ۸ هفته می‌توانید براحتی حمام کنید بهتر است پس از حمام محل ورود کاتتر را با سه شوار خشک کنید.
- * مراقب باشید کاتتر مخصوصاً موقع تعویض لباس کشیده نشود.
- * مواقعی که دیالیز نمی‌شوید روی کاتتر را بپوشانید و با استفاده از ثابت کننده لوله کاتتر مانند سرچی فیکس روی پانسمان گردن از حرکت بی‌مورد لوله‌ها جلوگیری نمایید.
- * تاریخ تعبیه کاتتر را به خاطر بسپارید.
- * در صورت باز شدن بخیه‌ها و یا جابجایی لوله‌ها قبل از اقدام به هر کاری فوراً به پزشک مربوطه مراجعه نمایید.
- * در صورت خارج شدن اتفاقی کاتتر محل خروج کاتتر را محکم فشار دهید تا از خونریزی جلوگیری شود و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.



مراقبت از کاترهای دو جداره موقت ودائم (شالدون)

“ویژه بیماران”



منبع :

۱- برونر سودارث

تاریخ تهیه : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

بازنگری : ۱۴۰۵/۰۹/۲۸

ID: SH-PE-Pa/۷۳-۰۱-۰۲/۱۰

- * در صورت مشاهده قرمزی، التهاب، خونریزی، ترشح زرد زنگ چرکی وتورم سریع به پزشک مراجعه نمایید.
- * هنگام باز نمودن سر کاترها توسط پرستار حتماً جهت پیشگیری از انتقال عفونت از ماسک استفاده کنید.

واحد آموزش به بیمار بیمارستان ساسان

آدرس : تهران - بلوار کشاورز - شماره ۴۳

تلفن : ۸۹-۸۸۹۶۵۱۷۰ داخلی ۷۳۹

info@sasanhospital.com

- * در صورت بروز هرگونه تحریک و خارش در محل بخیه ها به هیچ عنوان به آن دست نزنید.
- * مراقب تا شدگی و یا خمیدگی لوله ها باشید و از دستکاری آنها بپرهیزید.
- * کلامپ قطع جریان خون که در هردوشاخک لوله است و پیچ های سرلوله به هیچ عنوان بازوبسته نشود.

