

آنژیوپلاستی چیست ؟

آنژیوپلاستی قلب عملی است که توسط متخصص قلب و عروق یا جراح برای رفع انسداد یک یا چندین شریان که خون عضله قلب را تامین می‌کنند، استفاده می‌شود. بیماران که به آنژیوپلاستی نیاز دارند، ممکن است علائمی مانند درد و ناراحتی در قفسه سینه یا تنگی نفس را تجربه کنند. در این عمل، پزشک یا جراح از روش‌هایی مانند استفاده از بالن آنژیوپلاستی یا استنت‌گذاری در شریان‌های قلبی برای گشودگی و بازسازی شراین استفاده می‌کند. این روش‌ها بهبود جریان خون به عضله قلب شده و علائم تنگی و درد قفسه سینه را بهبود می‌بخشد. پس از آنژیوپلاستی، بیمار بهبود بسیار زیادی در علائم خود پیدا می‌کند و فعالیت‌های روزمره خود را راحت‌تر انجام می‌دهند.


چه افرادی کاندید آنژیوپلاستی میشوند ؟

بیمارانی که دچار آنژین قلبی (صدری) یا درد قفسه سینه به دلیل کاهش جریان خون به عضله قلبی هستند افرادی که دچار تنگی نفس هستند نیز جزو گزینه‌های احتمالی آنژیوپلاستی قلب هستند. تنگی نفس می‌تواند ناشی از کاهش جریان خون به عضله قلب در حین فعالیت فیزیکی یا حتی هنگام استراحت رخ دهد. افرادی که در آنژیوگرافی انجام شده گرفتگی عروق دارند

افرادی سکتة قلبی حاد در ۲۴ ساعت اول سکتة قلبی بیمار مبتلا به سندروم حاد کرونری (آنژین ناپایدار قلبی)

رهنگامی که درمان دارویی یا تغییر شیوه زندگی برای بهبود سلامت قلب کفایت نکند یا در صورت وقوع سکتة قلبی ، درد صدري وخيم شونده (آنژین صدري) و یا علائم دیگر ، پزشک ممکن است آنژیوپلاستی را به عنوان انتخاب درمانی پیشنهاد کند


آنژیوپلاستی اغلب با جای گذاری یک لوله توری سیمی به نام استنت همراه است تا به باز نمودن شریان کمک کند (استنت های آغشته به دارو) و برخی دیگر فاقد پوشش دارویی هستند (استنت های فلزی خاص





آنژیوپلاستی

“ویژه بیماران”



منبع : بروزر سودارث

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

بازنگری : ۱۴۰۵/۰۹/۲۰

ID: SH-PE-Pa/۰۹-۰۱-۰۲/۰۹

- ۲- وزن را در محدوده سلامت نگهدارید .
- ۳- بیماری های دیگر مانند دیابت یا پرفشاری خون را کنترل کنید .
- ۴- به طور مرتب ورزش کنید .
- ۵- از رژیم غذایی کم چرب و کم کالری استفاده نمائید .
- ۶- سعی نمائید استرس و اضطراب خود را کاهش و از نظر روحی آرامش خود را حفظ نمائید .
- ۷- در صورت دفع ملنا و یا علایم خونریزی گوارشی و یا خونریزی فعال به پزشک خود اطلاع دهید

واحد آموزش به بیمار بیمارستان ساسان

آدرس : تهران - بلوار کشاورز - شماره ۴۳

تلفن : ۸۹-۸۸۹۶۵۱۷۰ داخلی ۷۳۹

info@sasanhospital.com

اقدامات پس از عمل :

- ۱- یک روز بستری در بیمارستان جهت کنترل خونریزی و مانیتورینگ عمل قلب.
- ۳- در صورت خونریزی و احساس درد فزاینده و ناراحتی در محل ورود کاتتر به بخش اطلاع دهید .
- ۴- در صورت وجود علائم عفونت مانند تورم ، ترشح یا تب به پرستار اطلاع دهید .
- ۵- در صورت وجود درد یا تنگی نفس به پرستار خود اطلاع دهید .
- ۶- دستورات دارویی پزشک درمانگر را رعایت نمائید ، مخصوصاً داروهای رقیق کننده خون مانند آسپرین و پلاویکس

خودمراقبتی :

- ۱- سیگار را ترک کنید . و داروها را طبق دستور مصرف کنید